



4 MANEJAR AS VACAS E AS NOVILHAS NO PRÉ-PARTO

O bom manejo das vacas no pré-parto é decisivo para a produtividade da vaca na lactação, bem como para o retorno mais rápido à atividade reprodutiva, prevenção de problemas sanitários e obtenção de bezerros saudáveis. É nesse período que ocorre o maior desenvolvimento fetal e a mobilização das reservas corporais para o parto e para a nova lactação.

4.1 SEQUE AS VACAS 60 DIAS ANTES DO PARTO PREVISTO

Independentemente da produção, deve-se secar as vacas 60 dias antes do parto.

O processo de secagem consiste na interrupção da lactação e deve ser realizado 60 dias entre o fim da lactação e o parto. Este período de descanso tem por objetivo proporcionar a regeneração dos tecidos secretores de leite para a próxima

lactação e, assim, uma boa reserva de colostro, assegurar um melhor desenvolvimento do feto e completar as reservas corporais da vaca.

Para realizar a secagem, devem-se alterar de uma só vez os principais fatores que influem na produção de leite, isto é, a alimentação e os estímulos psíquico-hormonais (presença do bezerro, das companheiras do rebanho, presença à sala de ordenha, cheiro de ração e/ou silagem etc.)

Atenção: O período de 60 dias antes do parto para o descanso do úbere é necessário para intensificar a regeneração e a formação dos alvéolos (unidades secretoras do leite).

Para identificar as vacas que estão prontas para serem secadas, devem-se consultar as listas de secagem obtidas da ficha de controle deaios e cobrições (ver modelo na p. 90).


4.1.1 AVALIE A CONDIÇÃO CORPORAL À SECAGEM

A avaliação da condição corporal à secagem é importante para a monitoração do manejo nutricional durante o terço médio e o final da lactação. As vacas devem secar com escore próximo àquele recomendado ao parto, lembrando que, no final da gestação, há prioridade em direcionar os nutrientes para o crescimento final do feto.



4.1.2 COLOQUE AS VACAS EM UM PIQUETE DE VACAS SECAS

Após a secagem, as vacas secas devem permanecer separadas das vacas em lactação, em um piquete com pasto de boa qualidade. Na época da seca, se necessário, deve-se possibilitar que as vacas sejam suplementadas.



4.2 COLOQUE AS VACAS E AS NOVILHAS NO PIQUETE MATERNIDADE

Um mês antes do parto, os animais devem ser conduzidos a um piquete maternidade localizado próximo do curral, para facilitar a observação das vacas que estão prestes a parir. O piquete maternidade deve ter boa pastagem, ser bem sombreado, limpo, drenado, com fácil acesso, e ter água em abundância. Além disso, deve ser afastado do trânsito de máquinas e tratores.

4.2.1 LEVE O ANIMAL PARA O PIQUETE MATERNIDADE



4.2.2 FORNEÇA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Na maternidade, a vaca deve ser alimentada com uma dieta semelhante àquela fornecida para as vacas em lactação.



4.2.3 OBSERVE A VACA PELO MENOS DUAS VEZES AO DIA

Os partos podem ocorrer durante o dia ou à noite. Contudo, o parto geralmente ocorre nas horas mais calmas, como no início da manhã. A presença de muco ou descarga vaginal é um sinal de que a vaca está próxima de iniciar o trabalho de parto.



Atenção: O produtor deve ficar atento para a presença de predadores, como cachorros e urubus, que podem atacar os bezerros recém-nascidos e as vacas recém-paridas.